



SCUOLA DI MEDICINA OMEOPATICA DI VERONA

SEDE : Via B.Bacilieri, 1A - 37139 Verona - tel. 045.8905600 - fax 045.8901817 – e.mail info@omeopatia.org

www.omeopatia.org

Tesi di MATERIA MEDICA

“ ONOSMODIUM VIRGINIANUM ”

dott. Maurizio Impallomeni

1. Nome del rimedio e caratteri botanici

Onosmodium virginianum.

Il genere *Onosmodium* è un'erba perenne di origine nordamericana, appartenente alla famiglia delle *Boraginaceae*. Detto Falso litospermo, molto simile all'inglese *Onosma*, ha piccoli fiori giallo-verdastri.



2. Preparazione

Il ceppo si ricava dalla tintura della pianta fresca intera, inclusa la radice, macerata in una quantità doppia di alcool .

3. Uso tradizionale e/o storico e/o farmacologico

Non è riportato nessun particolare utilizzo di tipo fitoterapico.

4. Sperimentazione originale

Sperimentato in dosi materiali da W.E. Green, dell'Arkansas, nel giugno 1885

5. Patogenesi.

- La caratteristica della sperimentazione è la mancanza di concentrazione o di coordinazione, che si rivelano nella difficoltà di concentrare il pensiero, di mettere a fuoco la vista, di coordinare la muscolatura, di stimare l'altezza dell'ostacolo, salendo dei gradini. Si manifestano anche con vertigini, sensazione di intorpidimento e senso di generale prostrazione muscolare. L'azione è una depressione dei centri cerebro-spinali con paresi (specie degli occhi e degli arti inferiori) e disturbi della coordinazione.

- La seconda componente sono i dolori nevralgici, di tipo sordo, pesante, che interessano i nervi cervicali, spinali e gli organi pelvici (occhi, occipite, con estensione dagli occhi all'occipite, sacro); congestioni utero-ovariche, cefalea. Sono interessati anche gola, intestino, mammelle, cuore ed estremità; il lato più colpito è il sinistro.

- L'azione paretica sui muscoli intrinseci dell'occhio è testimoniata dai sintomi: "sensazione di tensione negli occhi come quando si sforzano per leggere caratteri piccoli" e "desiderio di allontanare gli oggetti per guardarli", che sono una chiave dell'azione della sostanza.

- Clarke riporta una casistica di cefalee associate a disturbi oculari miopico-astigmatici

- Clarke riporta anche l'osservazione di S.A.Jones che identifica nella attenuazione della libido sia nel maschio che nella femmina, l'azione primaria della sostanza, distinguendola da PIC AC in cui essa è preceduta da una fase eccitatoria.

6. Generalità :

- Tremore al minimo sforzo
- Sensazione di tremore nervoso come da fame
- Sensazione di nervosismo e scuotimento che lo rende fisicamente e psichicamente inabile a qualunque compito
- Sente i muscoli instabili
- Incapacità di coricarsi sul lato sx.
- Disagio generale e sensazione di pienezza
- Sensazione di leggerezza simile a quella causata da un anestetico (cloroformio)
- Sensazione di camminare sul cotone.
- Debolezza: al mattino, con rigidità; con dolore, stiramenti, sbadigli e sensazione sgradevole
- Boericke: "agisce come se fosse nato stanco"
- Sonno: insonnia; sonno difficile e interrotto; irrequieto e con sveglia al mattino presto; con molti sogni di vario tema.

- Temperatura: ogni giorno, verso mezzogiorno o le 13, sensazione di brividi di freddo; sensazione di vampate di calore in tutto il corpo; assenza di sudorazione anche con clima molto caldo.
- Alimentazione: aumento dell'appetito; fame dopo aver riposato il pomeriggio oppure "nervosa", durante tutta la giornata; appetito e sete diminuiti, sete di bevande fredde spesso; disgusto per l'acqua.
- Boericke: provoca una diminuzione del desiderio sessuale in entrambi i sessi; da ciò la sua omoeopaticità, nella nevrastenia sessuale. - Vita sessuale depressa o perduta nelle donne.

7. Raggruppamento tematico dei sintomi

H. Voisin mette in evidenza alcuni quadri sintomatici tipici:

a. "dolore agli occhi da surmenage oculare" con:

- fatica oculare, specie nei soggetti astenopici o presbiti
- dolore agli occhi che sembrano pesanti e rigidi ma non sono arrossati
- frequente sensazione di pesantezza o cefalea frontale pesante od occipitale costrittiva; la cefalea, diversamente dalla modalità generale, è aggr. coricandosi sul dorso
- può essere presente un certo grado di lentezza cerebrale
- aggr. leggendo piccoli caratteri

La diagnosi differenziale è con:

- RUTA - sforzo oculare fine o con poca luminosità; occhi più rossi; senza cefalea
- SCUTELLARIA - occhi più sensibili al contatto e cefalea frontale
- CROCUS - astenopia alla luce artificiale con lacrimazione; adatto più ai miopici
- STRONTIANA CARB - irritazione oculare con congestione e lacrimazione
- NAT MUR - dolore oculare dopo fissazione prolungata di un oggetto
- PHYSOSTIGMA - disturbi da surmenage oculare ma senza dolori; la cefalea è aggr. dallo sforzo mentale
- PARIS - la cefalea è aggr. dallo sforzo mentale; sensazione che gli occhi siano troppo grossi o tirati indietro.

b. "la congestione utero-ovarica" con:

- congestione cronica che provoca dolore utero-ovarico con sensazione costante che stiano per iniziare le mestruazioni;
- mestruo anticipato, abbondante e prolungato

- frequenti dolori contemporanei a ovaie e retto; leucorrea abbondante, irritante e depressione cerebrale, fisica e sessuale
- è possibile anche un gonfiore mammario con intolleranza alla costrizione dei vestiti sul petto e la concomitanza dei disturbi oculari tipici

La diagnosi differenziale è con:

LACH – intolleranza ai vestiti stretti, dolore ovarico specie a sx., migl. dal mestruo

CENCHRIS – intolleranza ai vestiti stretti, dolore ovarico dx.

LILIUM TIGR – donna nervosa e scontrosa; dolore ovarico specie a sx., aggr. camminando sul terreno sconnesso; eccitazione sessuale

GOSSYPIUM – donna debole ma nervosa; dolori ovarici più intermittenti

VIBURNUM OPULUS – donna debole; dolori più spasmodici, irradiati alle cosce e spesso accompagnati dal bisogno di urinare

SENECIO – donna debole; dolori vescicali concomitanti o alternati e dolori lombari

c. “Il paretico con mancanza di sicurezza nei movimenti” con:

- paresi muscolare in particolare alle gambe
- sensazione di intorpidimento alle gambe
- mancanza di sicurezza camminando o nei gesti, da cui deriva esitazione, paura, apprensione
- un certo grado di lentezza cerebrale
- frequente sensazione di rigidità dolorosa; andatura barcollante o a scatti; tremori da sforzo; vertigini guardando in basso; nei casi accentuati, incoordinazione grave.

La diagnosi differenziale è con rimedi che presentano lentezza cerebrale:

GELS – ha più tremori e paura (fifa)

ASTRAGALUS – confusione cerebrale molto forte, aggr. il mattino.

d. “lentezza e obnubilazione cerebrale” con:

- depressione mentale con lentezza dell’ideazione e della comprensione
- difficoltà di concentrazione
- diminuzione del desiderio sessuale
- frequenti sono l’oblio, le vertigini, la paresi degli arti inferiori, i tremori da sforzo

La diagnosi differenziale è con:

- In caso di diminuito desiderio sessuale:

GELS – più emotivo e con tremori intensi e costanti

PHOS AC – più debolezza fisica e indifferenza

NUX MOSCH – più ebetudine, indifferenza e sonnolenza; aggr. dal freddo umido; migl. in una stanza calda

- In caso di desiderio sessuale abbastanza conservato:

ANAC – più perdita di memoria e più nettamente migl. mangiando; non è aggr. dall'aria caldo-umida; conseguenze di surmenage cerebrale
OLEANDER – più triste e con forte appetito
LUPULUS – depressione generale con più tremori e frequenti eiaculazioni

e. “la debolezza sessuale con perdita del desiderio” con:

- forte diminuzione o perdita totale del desiderio
- erezione debole ed eiaculazione rapida
- un certo grado di depressione mentale
- frequente debolezza e intorpidimento delle gambe

La diagnosi differenziale è con:

AGNUS CASTUS – ansia e sfiducia dopo abusi di eccitanti e sussuali; impotenza nonostante l'eccitazione; Lentezza mentale e debolezza della memoria
GELS – l'impotenza è dovuta alla paura

8. Modalità

- ❑ Aggr. leggendo o con sforzo oculare
- ❑ Aggr. con i vestiti che stringono l'addome
- ❑ Aggr. nell'oscurità
- ❑ Aggr. scendendo una scala
- ❑ Aggr. con l'aria calda e umida

- ❑ Migl. coricato sul dorso (esclusa la cefalea)
- ❑ Migl. col riposo e col sonno
- ❑ Migl. mangiando

9. Sintomi particolari importanti

Testa

- Perdita della memoria.
- Sensazione di aridità del naso.
- Confusione.
- Sensazione sorda, pesante, di instabilità, premente verso l' alto, nell' occipite.
- Sensazione di pesantezza che migl. mangiando o dormendo e una cefalea che si presenta con:
 - dolore frontale sugli occh, più sull'occhio sx. o che si sposta a sx, che scorre indietro verso il collo, aggr. al buio e coricandosi oppure aggr. dal movimento e dall'agitazione, che lo costringono ad andare a letto
 - dolore alla tempia sx. come una frecciata acuta
- Dolore occipito-frontale di mattina al risveglio, principalmente sul lato sinistro.

- Dolore nelle tempie e mastoide (CAPS)

T.F. Allen mette in evidenza l'utilità clinica in casi di cefalea da sforzo oculare con sensazione di tensione negli occhi o associazione con disturbi dell'udito e vertigine.

Rumori auricolari come muggiti o fischi anche associati a otite media cronica. ONOSM cura la cefalea e il dolore auricolare ma non attenua i rumori.

Occhi

- Vista confusa; papilla del nervo ottico iperemica e vasi retinici allargati.
- Sensazione di tensione negli occhi; peggiorata usandoli.
- Sensazione di stanchezza negli occhi come per aver perso molto sonno
- Sensazione di tensione come da sforzo di lettura di piccoli caratteri
- Sensazione sgradevole guardando oggetti vicini
- Ambliopia da alcolismo
- Muscoli interni dell'occhio paretici
- Dolore nei bulbi oculari tra l'orbita e la pupilla, che si estende alla tempia sinistra.
- Gli oggetti gli sembrano grandi e quindi solleva i piedi eccessivamente per superare piccoli ostacoli quando cammina (key note)

Edward Pollock Anshutz lo confronta con PICR AC, che riesce a vedere chiaramente solo oggetti molto ravvicinati (sei pollici dall'occhio, cioè 15-16 cm) e con NAT SULPH, che ha difficoltà a vedere gli oggetti lontani

Orecchio

- Pienezza nelle orecchie o sensazione di canti (come da intossicazione da chinino)

Gola

- Aridità notevole
- Secrezione dalle narici che cola posteriormente
- Sensazione scorticante, raschiante
- Sensazione di ostruzione nelle narici posteriori
- Secondo Boericke i sintomi sono peggiorati da bevande fredde, mentre secondo Clarke sono migl. con bevande fredde e mangiando

Torace

- Dolore iperacuto nelle mammelle; sensazione di gonfiore e di dolenzia
- Dolore al cuore; polso rapido, irregolare, debole o forte
- Prurito dei capezzoli

Apparato genitale maschile

- Impotenza psichica
- Perdita del desiderio
- Eiaculazione precoce
- Erezioni deficienti
- Può manifestarsi anche costante eccitamento sessuale con erezioni persistenti

Apparato genitale femminile

- Desiderio sessuale completamente scomparso
- Sensazione come se le mestruazioni dovessero apparire
- Mestruazioni troppo precoci e troppo prolungate
- Sensazione di contusione nella regione uterina
- Leucorrea, gialla, acre, abbondante
- Dolore ovarico aggr. dalla pressione, tagliente e pulsante
- Dolore pesante e dolori pulsanti lenti che iniziano in un ovaio e passano all'altro, lasciando un indolenzimento
- Crampi uterini come per aver preso freddo durante il mestruo
- Indolenzimento in regione uterina, migl. spogliandosi o coricandosi sul dorso, aggr. dai vestiti stretti (Key note)

Estremità

- Arti superiori
 - Tremore a braccia e mani
 - Non riesce a scrivere o a mangiare per incoordinazione dei movimenti
 - Dolori alle articolazioni delle dita
 - Dolore nella regione scapolare sinistra.
- Arti inferiori
 - Disturbi dell'andatura con insicurezza nel salire i gradini
 - Il marciapiede sembra troppo alto; per questo solleva troppo le gambe e vacilla; questo gli aggr. la cefalea
 - Sensazione di stanchezza ed intorpidimento nelle gambe, negli spazi poplitei e sotto le ginocchia.
 - Andatura vacillante.
 - Grande debolezza muscolare e stanchezza
 - Formicolio ai polpacci

12. Repertorio Synthesis versione 9.1:

- Sintomi con ONOSM come unico rimedio:

- MENTE - DI SPERAZIONE - impotenza; con
- MENTE - ILLUSIONI - cadere - fuoco camminandogli vicino; di cadere nel

- MENTE - GESTI , fa - stanco; agisce come se fosse nato
- MENTE - ILLUSIONI - camminare, di - bambagia; cammina sulla
- MENTE - ILLUSIONI - cadere - guarda - giù; cade se guarda - piano di sotto; scendendo al
- MENTE - ILLUSIONI - ubriaco - stato ubriaco; di essere - settimana; per una
- MENTE - PAURA - cadere, di - salendo le scale
- TESTA - DOLORE - sdraiandosi - buia; in una stanza - aggr.
- TESTA - DOLORE - Fronte, nella - occhi - sopra - buio, al
- TESTA - DOLORE - Tempie - buio, al
- TESTA - PIENEZZA - sonno - migl.
- TESTA - PIENEZZA - mangiare - dopo - migl.
- OCCHI - APRIRE le palpebre - desiderio di tenere gli occhi spalancati
- GOLA - DOLORE - vivo, a, come da scorticatura - mangiare - migl.
- STOMACO - APPETITO - aumentato - siesta, dopo
- ADDOME - DOLORE - Ombelico - regione ombelicale - piegandosi - indietro, all' - migl.
- MASCHILI , GENITALI - EREZIONI - sdraiato, stando - schiena; sulla
- ESTREMITÀ - CAMMINARE, andatura - solleva le gambe troppo in alto
- ESTREMITÀ - DEBOLEZZA - Gamba - sera - cammina; mentre
- ESTREMITÀ - FORMICOLIO - Dita dei piedi - quarto; lato esterno del
- ESTREMITÀ - INTORPIDIMENTO - Ginocchio - incavo del ginocchio
- ESTREMITÀ - SCATTI , scosse ecc. - fianco - non poggia; sul quale
- ESTREMITÀ - SCATTI , scosse ecc. - sdraiato; stando - fianco; sul

- Sintomi al 3° grado:

- MENTE - CONFUSIONE mentale
- MENTE - INDIFFERENZA, apatia
- MENTE - IRRESOLUTEZZA, indecisione - azioni, nelle
- MENTE - IRRESOLUTEZZA, indecisione
- TESTA - DOLORE - Occipite e Fronte - mattina, al risveglio
- TESTA - DOLORE - Occipite
- TESTA - DOLORE - guardando - fisso qualcosa - per aver guardato
- VERTIGINI - VERTIGINI
- VISTA - SFORZO - visivo aggr.
- VISTA - GRANDE - oggetti, gli, sembrano grandi - solleva i piedi eccessivamente per superare piccoli ostacoli quando cammina
- OCCHI - ASTENOPIA - muscolare
- SCHIENA - DOLORE - continuo (indolenzimento) - Lombosacrale, regione
- SCHIENA - DOLORE - Sacrale, regione
- SCHIENA - DOLORE - Lombosacrale, regione

13. Sintomi mentali : raggruppamento tematico dei nuclei fondamentali. Sintesi descrittiva mentale.

- ❑ Loquace, ma fa discorsi sconnessi
- ❑ Irritabile
- ❑ Indeciso
- ❑ I minuti gli sembrano ore
- ❑ Sensazione che qualcosa di terribile stia per accadere e di essere incapace di sopportarla
- ❑ Paura: di guardare in basso, per paura di cadere per le scale; di cadere nel camino, camminandoci vicino e realmente vacillando in prossimità del pericolo
- ❑ Vuole pensare e non muoversi; così assorto nei suoi pensieri fino fino a dimenticare tutto e dove si trova
- ❑ Scrive molto veloce ma non riesce a tenere il passo con le idee; omette parole e lettere; non riesce a concentrarsi sull'argomento
- ❑ Disattento e apatico
- ❑ Smemorato; dimentica che sta leggendo e lascia cadere con indifferenza il libro, sommerso da pensieri vaghi

Secondo Roger Morrison il soggetto, in un senso più ampio, ha problemi a mettere a fuoco le cose della sua vita; non riesce a trovare se stesso o la sua attitudine lavorativa.

Edward Pollock Anshutz, che scrive all'inizio del '900 in un'epoca in cui stavano avanzando le teorie malthusiane di controllo delle nascite, attribuisce un ruolo "sociale" al rimedio; quello di contribuire all'armonia familiare restituendo alla donna la voglia di ricercare la soddisfazione sessuale, così gratificando il "marito insoddisfatto", disincentivandone le spinte adulterine.

14. Sintesi originale dell'immagine del rimedio.

Il nucleo patogenetico è l'azione depressiva cerebro-spinale con indebolimento della memoria e del pensiero e una azione sul sistema neuro-muscolare che porta ad incoordinazione motoria, particolarmente degli arti inferiori e a disturbi della muscolatura oculare sia intrinseca che estrinseca con problemi di messa a fuoco. La combinazione di queste componenti si manifesta anche nella riduzione della spinta sessuale in entrambi i sessi.

15. Diagnosi differenziale con i rimedi più prossimi per le tematiche generali o per sistemi particolari importanti.

NAT MUR - dolore oculare dopo fissazione prolungata di un oggetto; cefalea peggiorata al sole, segue la curva solare

LILIUM TIGR - donna nervosa e scontrosa, arrabbiata; dolore ovarico specie a sx., aggr. camminando sul terreno sconnesso; eccitazione sessuale

AGNUS CASTUS - ansia e sfiducia dopo abusi di eccitanti e sussuali; impotenza nonostante l'eccitazione; Lentezza mentale e debolezza della memoria

GELS - ha più tremori, intensi e costanti; paura (fifa); più emotivo; grande fatica e debolezza; cefalea occipitale e pesantezza della testa

PIC AC - affaticamento mentale che gli impedisce di concentrarsi e leggere; aumentato desiderio ed erezioni costanti

16. Fonti bibliografiche

La sostanza è stata sperimentata nel 1885 e non compare nelle materie mediche di Hahnemann, e Hering.

1. J.H.Clarke, *Dizionario di Farmacologia omeopatica clinica (Dictionary of Practical Materia Medica)*, Vol II, pagg. 1860-1867, Nuova Ipsa ed., 1997
2. H. Voisin, *Matière médicale du praticien homéopathe*, pagg. 901-904, 2° ed., Maloine S.A : Ed., 1976
3. W.Boericke, *Materia Medica omeopatica*, Londra, Homeopathic Book, 1998
4. Roger Morrison, *Manuale guida ai sintomi chiave e di conferma*, Bruno Galeazzi ed., Bassano del Grappa, 1998
5. T.F. Allen, *Hand book of materia medica and Homeopathic Therapeutics*
6. E.P. Anshutz, *New Old and Forgotten Remedies*
7. S.R. Phatak, *Materia Medica of Homeopathic Medicines*

Settembre 2006